

GAMMA HYDROXY BUTYRATE (GHB) **Addiction Fact Sheet**

GHB Addiction & Rücknahme-Syndrom

Mit Trinkia Porrata

GHB-IS IT-süchtig?

Internet dribble im Gegenteil, gamma hydroxybutyrat (GHB) ist eine süchtig machende Droge. Der Rücktritt können schwerwiegend sein und verlängert. Doch Anerkennung und Behandlung von GHB Sucht / Rücknahme ist nicht ohne weiteres verfügbar. Wissen von GHB von der Öffentlichkeit und in den Bereichen Strafverfolgung / Medizin ist in der Regel beschränkt auf ihren Missbrauch als intoxicant und Verwendung als Waffe Vergewaltigung. GHB Sucht ist charakterisiert durch rund um die Uhr Dosierung (alle ein bis drei Stunden, Tag / Nacht, mit schwereren Dosen in der Nacht schlafen zu erreichen). Sucht entwickeln kann in ein paar Wochen. Verwenden Sie für vier bis acht Monaten ist unter den 600 GHB-Abhängigen, haben sich nach vorn zu helfen, durch die GHB Addiction Helpline über www.projectghb.org. Andere wurden mit bis zu zehn Jahren, so dass es unmöglich zu wissen, zu welchem Zeitpunkt sie wurde süchtig.

ADDICTION SCENARIO

Gelegentliche Nutzer sind in Gefahr, von Vergewaltigung, Überdosierung und Tod, aber nicht als wahrscheinlich, dass sich ein Suchtverhalten. Diejenigen mit GHB auf einer täglichen Basis systematischer oder als Anti-Beruhigungsmittel, Schlafmittel, ein Workout Beihilfen, Gewichtsverlust Produkt, ein Anti-Aging-Stoff, usw., sind in Gefahr, von Sucht,

die aufgrund ihrer Muster der regelmäßige, häufige verwenden. Von einer nächtlichen Schlaf Beihilfen, zum Beispiel, verwenden Sie bewegt sich lässig in ein Morgen "wake up"-Beihilfen. Dann ist es erforderlich, am Nachmittag, nach Sex haben, gehen in der Öffentlichkeit, usw., bis er Fortschritte gemacht hat, um rund um die Uhr nutzen. Oft sind die Muster entwickelt, ohne den Anwender zu realisieren, was passiert ist, da sie normalerweise nicht sehen es als eine "Droge" oder unsichere in irgendeiner Weise, weil der Internet-Zusicherungen. Ursprünglich Nutzer das Gefühl, dass sie gefunden haben, die perfekte Ergänzung und schwören auf die unglaubliche Vorteile, die sie denken, sie sind zu sehen. In der zweiten Phase, allerdings kommt, wenn die Flitterwochen vorbei ist aber der Benutzer ist der letzte zu wissen. Freunde, Ehegatten und Co-Arbeiter beginnen zu beobachten, bizarre Verhalten ändert, häufig mit keine Ahnung von der Sache. Episoden können so subtil als Single "Kopf-Snap", das auftritt, etwa 15 Minuten nach der Einnahme einer Dosis, oder kann auch mehrere Minuten twitching, ein merkwürdiges Verhalten, oder schwarz outs. Diese Episoden kann auftreten, erst nach der nächtlichen schwerer Dosen oder nach dem praktisch jeder Dosis. So brechen die Badezimmer-Spiegel, während sich bereit für Bett, oder gefunden wird oder Aufwachen in das Badezimmer Stock mit einem blutigen (oder defekt) Nase ist nicht selten als Folge der "Kopf-Snap", was dazu führen kann, trifft auf den Spiegel oder den Rand der Spüle. Häufig werden die Süchtigen hat keinen Rückruf von solchen Vorfällen. Die Süchtigen wächst weit entfernt von Ehegatten, Familie und Freunde und können beginnen, sich aus öffentlichen kontaktieren oder sich verführen von Pornographie oder Streifen Gelenke, die möglicherweise eine Änderung des Verhaltens

der insgesamt aus dieser Ausstellung vor GHB verwenden. GHB Drogenabhängigen typischerweise Bericht zahlreiche betrunken / Drogen treibende Episoden, die häufig nicht erkannt oder nicht identifizierte durch die Strafverfolgungsbehörden, vor allem, wenn es wurde kein Gebrauch von Alkohol oder anderen Drogen. Viele Süchtige Bericht Schaden von "unbekannter Herkunft", die auf ihre Autos und werden unsicher, wo ihr Auto gefunden werden können am Morgen, erneut auf die mangelnde Erinnerung an Ereignisse auftreten, während sie sich berauschten.

WHO sind die G-AHOLICS?

- Bodybuilder / andere Sportler, darunter Profis, mit GHB für eine Schlaf-oder Workout Beihilfen oder Gewichtsverlust Werkzeug - die größte Gruppe.
- Business-Profis, häufig reisen und wurden eingeführt, um GHB als "sicher" schlafen Beihilfen.
- ältere Menschen,, wurde gesagt, dass GHB ist ein Anti-Aging-Verbindung.
- Menschen mit Depressionen vor,, wurde gesagt, dass GHB ist ein Anti-Beruhigungsmittel. Berauschten Wirkung von GHB kann es scheinen, zunächst, dass dieser Effekt haben, aber es später dreht sich bei vielen von ihnen.
- Menschen unter Drogen-Test-Programmen verwenden, GHB als Ersatz Alkohol und Tests zu umgehen.
- Website-Managern, vor allem den Verkauf GHB und andere Sportarten / Nahrungsergänzungsmittel, und Computer-Programmierer.

HINWEIS: Obwohl GHB kann in Tests ermittelt, so bleibt es doch in Körperflüssigkeiten für eine relativ kurze Zeit im Vergleich zu anderen Drogen, es dauert im Blut für vier Stunden und im Urin für zwölf Stunden. Allerdings GHB ist noch nicht in den normalen Prüfungsverfahren der meisten Agenturen.

Analoga von GHB

Das Produkt aufgenommen werden können tatsächliche GHB, angefangen von zu Hause aus zu brauen ausländische pharmazeutische Qualität. Es ist oft ein analoges von GHB, eine chemische Cousin, dass Konvertiten zum GHB im Körper. Dies kann Gammabutyrolacton (GBL) oder 1,4-Butandiol (BD). GBL (alias 2 (3) H furanone Dihydroxy) ist sowohl ein Vorläufer (primäre Zutat bei GHB) und eine aktive analoge (wandelt im Körper zu GHB, mit der gleichen Wirkung). BD ist eine aktive analoge. Ein weiterer analoger ist gamma hydroxyvalerate (GHV). GBL, BD und GHV sind verfügbar unter Turnhallen, chemischen Versorgung-Läden, über das Internet und Versandhandel. Sie werden als Pulver, Kapseln, Gels oder Flüssigkeiten und finden in einer Vielzahl von Zusammenschlüssen, Farben und Geschmacksrichtungen. Es gibt mehr als 80 Straße / Handelsnamen für GHB / Analoga. GBL vor allem dazu finden Sie in der Hardware-Geschichte sind eine primäre Zutat in legitimen Anstrich Stripperinnen; dieser Ebene des Missbrauchs ist besonders gefährlich, da diese Produkte enthalten anderen Zutaten. Bogus Internet-Produkte sind in der Regel getarnt als "Tintenstrahl-Patrone Reiniger", "Fingernagel zum Entfernen von polnisch", usw.

GHB Überdosis & Addicts

GHB Drogenabhängigen typischerweise Erfahrung häufige Überdosierungen oder Mini-Überdosierungen. So sind sie oft als Opfer einer Überdosierung, ohne Anerkennung der zugrunde liegenden Ursachen Sucht dass diese häufigen Episoden. GHB hat eine steile Dosis Response-Kurve, und selbst mit der Entwicklung von Toleranz, ihre Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Addicts Mai in einer Dosis von zwei Muster-1) Exakte Dosierung in regelmäßigen Abständen, getrennt durch ein bis drei Stunden, mit leicht höheren Dosen in der Nacht zu schlafen, oder 2-Rund um die Uhr "nippen" aus einer Flasche des verdünnten Produkts. Constant nippen ist am ehesten zu produzieren Mini-Überdosierungen. Selbst mit genauen Dosierung, Wirkung abhängig von der winzigen Variationen in der Dosis, Unterschiede in der Ernährung, Mangel an Nahrung, oder anderen unbekanntem Gründen. Ein CEO eines großen Unternehmens weitervermittelt, dass er versuchen würde, um seine Dosis für Sitzungen (Dosis um 9:30 vor der Sitzung, wenn die Dosis war wirklich fälligen 10:00); würde dies manchmal zu einem Kopf-Snap-Episode in einem frühen Stadium des Board-Sitzung, so dass seine Mitarbeiter befremdet von seinem seltsamen Verhalten, das er einfach zu ignorieren versuchte.

GHB Entzugserscheinungen

Fehlt eine Dosis von mehr als ein paar Stunden sendet die Süchtigen in erheblichen Entzugserscheinungen. Dies ist in erster zeichnet sich durch profuse Schweißausbrüche, Angst-Attacken, und kann mit steigenden Blutdruck und Puls. BP auf

gefährliche Ebenen wurden dokumentiert. Dies kann nachlassen in ihrem eigenen nach zwei oder drei Tage oder als Reaktion auf Medikamente. So, am Tag drei, ein Patient kann "scheinen" zu tun, "gut" und kann aus einer Behandlung Zentrum vertraut mit GHB Rückzug. Die zweite Phase des Entzugs, dies kann unter anderem Halluzinationen und psychische Verfassung geändert werden, kann früher beginnen, kann aber auch zu Verzögerungen kommen auf rund Tag vier oder fünf. So kann ein Patient aus einem Zentrum in Behandlung drei Tage wurde durch seine Ehefrau hektischen Stunden später wandert durch die Stadt Straßen, halluzinierend, verwirrt und die Gefahr der Wanderschaft in Verkehr. Manchmal, Kliniker gehen davon aus Abhängigen zu psychotischen und nicht zu erkennen, die zugrunde liegenden Sucht / Entzug.

GHB Entgiftung Protokolle

Die Behandlung der GHB Rücknahme-Syndrom ist noch nicht klar definiert. Behandlung kann die Verwendung von Benzodiazepinen, antipsychotischen Medikamenten oder Phenobarbital. Es sei darauf hingewiesen, dass, obwohl GHB-spitz Dosen, vor der Entgiftung dazu beitragen können, reduzieren die Schwere der Rückzug, Versuche einiger Abhängigen zur Selbsthilfe entgiften, ohne ärztliche Hilfe, wurden tödlich sein, wie die Rücknahme-Syndrom kann schwere und nicht vorhersehbar. Weitere, wie die meisten Süchtigen sind nicht in der Lage zu tolerieren, die laufenden Symptome auf Widerruf, ist diese Methode häufig erfolglos wie auch gefährlich. 1-Miotto und Roth, März 2001 Artikel "GHB Rücknahme-Syndrom", auf der Texas Kommission auf Alkohol- und Drogenmissbrauch Website (www.

tcada.state.tx.us) beschreiben die schwere Entzugserscheinungen und empfehlen die Behandlung mit einer aggressiven 7 -- 14 Tage stationärer Strategie enger mit Follow-up. Sie stellen fest, "Benzodiazepine wie Lorazepam, Diazepam chlordiazepoxide und sind nützlich, einige Verbesserung der Anzeichen und Symptome von GHB Rückzug. Lade Dosen von oralen oder intravenösen Benzodiazepine nicht verringern die Wahrscheinlichkeit des Widerrufs Delirium, sind aber wichtig für die Steuerung psychotische Agitation. "Dies erfordert hohe Dosen von benzos. Antikonvulsiva und Antipsychotika sind ebenfalls diskutiert. Blutdrucksenkende Medikamente können erforderlich sein, in frühen Phasen zur Bewältigung der Renn-Herz und Blutdruck.

HINWEIS: Ein weiterer Arzt, hat sich mit zahlreichen GHB Rücknahme Fällen berichtet, eine Vorliebe für Clorazepat gegenüber anderen benzos und betont die Notwendigkeit, ein antipsychotischen beschäftigen (wie Olanzapin), bevor Psychose entwickelt.

Silvilotti, Burns, Aaron und Greenberg, Dezember 2001 Annals of Emergency Medicine, diskutieren Einsatz von Phenobarbital für den Rückzug von GHB und diskutieren fünf Patienten mit schwerer Rückzug aus GBL, was den Zugang zum ICU. Sie berichten von einem Median Krankenhausaufenthalt von fünf Tagen. Beachten Sie dabei, jeden Patienten ausgehalten hatten bereits vier oder fünf Tage ohne GHB / GBL vor der Zulassung, so dass diese im Einklang mit der 10-14 Tage-Frist insgesamt gesehen für Entgiftung / Entzug in den Hunderten von Fällen kommt durch unsere Website. Nichts ist dokumentiert erneut Follow-up mit diesen fünf Patienten.

Nach der laufenden Detox-Agonie

Mehrere Rückfälle sind häufig in der Mehrzahl der Fälle GHB Sucht. Viele beschreiben, dass GHB bleibt ein "Loch in deine Seele." Schaffung eines menschenwürdigen schlafen Muster ist oft ein Problem. Depression, auch bei suizidalem Ebenen, ist fast Standard. Angst-Attacken sind ebenfalls im Gange. Depressionen / Angst der Regel mit der Zeit abnehmen, wobei ein paar Wochen und für einige Monate oder sogar Jahre für andere. Viele erholt Suchtkranke brauchen Medikamente zumindest vorübergehend den Umgang mit den Sleep / Depressionen / Angst. Diejenigen mit vorheriger Depressionen zu haben scheinen die meisten Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Regelung für den meds, dass die Arbeit auch nach GHB verwenden. Eine versehentliche Überdosierung bei anderen Drogen, vor allem versuchen, Entgiftung, ohne angemessene medizinische Betreuung, sind gemeinsame, manchmal mit Todesfolge. Diese Todesfälle möglicherweise nicht erkannt, da im Zusammenhang mit GHB, da wird es keine GHB in ihrem System. Selbstmorde wurden zur Kenntnis genommen von 36 Stunden in detox auf mehrere Monate später, unabhängig davon, ob oder nicht gab es vor Depressionen oder psychischen Gesundheit. Viele haben mittlerweile Arbeitsplätze verloren, finanzielle Sicherheit, Familie und andere Beziehungen. Viele sehen nicht selbst als "Abhängigen" wegen ihrer Beteiligung unbeabsichtigte mit dieser Drogen-und scheuen AA / NA Sitzungen. Sie müssen erkennen, ihren Status als tatsächlich "süchtig" und brauchen Verständnis in der Behandlung und Sitzungen auf die Seite legen diese Entfremdung. Wie bei jedem Medikament, Akzeptanz ihrer Sucht ist von entscheidender Bedeutung für das Management.

Ärzte & Einrichtungen erfahrenen w / GHB Rücknahme oder bereit zu handhaben diesen Fällen werden gebeten, Kontakt mit uns auf, damit sie zugesetzt werden dürfen, um unseren Empfehlungsservice Liste.

Helfen Sie uns halten Project GHB eine wichtige Quelle der Hilfe und Informationen.

Spenden akzeptiert on-line unter www.ProjectGHB.org.

Volunteer Möglichkeiten ist auch verfügbar, siehe www.ProjectGHB.org für Details oder um sich anzumelden.

Spenden können an

Ste. 101 PMB 434 • 2753 E. Broadway •
Mesa, AZ 85204

www.project.ghb.org

Kontakt Trinka Porrata in (408) 219-1180

Project GHB ist eine 501 (c) (3) Non-Profit-Organisation.

Alle Spenden sind steuerlich absetzbar.